

CUIDADOS POSTOPERATORIOS PARA CORONA

(CITA 15)

- Como con la mayoría de los procedimientos dentales, el área alrededor del diente estará sensible durante algunos días debido a la instrumentación alrededor de los tejidos o a la administración de anestesia (especialmente en la mandíbula inferior). Esto debería mejorar en unos pocos días.
- La sensibilidad a temperaturas calientes/frías o al masticar es normal debido a la irritación causada por el procedimiento en sí o por la corona temporal.
- La corona temporal se colocará con un cemento débil, por lo tanto, evite masticar alimentos pegajosos o duros o chicle. Al usar hilo dental, tenga especial cuidado al retirar el hilo dental tirando hacia un lado y no hacia arriba entre los dientes. Una vez que se haya colocado la corona permanente, el uso del hilo dental puede reanudarse normalmente.
- Si siente que su mordida está desigual una vez que desaparezca la anestesia, llame a nuestra oficina para programar una cita y ajustar su oclusión (mordida). Esta mordida desigual ejerce demasiada presión sobre un diente específico, causando dolor en el diente y la rotura de la corona temporal.
- Si la corona temporal se desaloja, guarde la corona temporal y póngase en contacto con nuestra oficina para que se vuelva a cementar. Si esto ocurre después del horario de oficina, se puede usar una pequeña cantidad de pasta de dientes o adhesivo para dentaduras en el interior de la corona temporal como cemento hasta que pueda regresar. NUNCA vuelva a cementar una corona temporal o permanente con pegamentos, cementos o adhesivos domésticos.