

CUIDADOS POSTOPERATORIOS PARA OBTURACIONES COMPUESTAS (BLANCAS)

- Las nuevas obturaciones están completamente "listas" al final de la cita; por lo tanto, puede masticar tan pronto como se sienta cómodo. Tenga cuidado de no morderse la mejilla, la lengua o los labios hasta que la anestesia haya desaparecido por completo.
- La sensibilidad al calor/frío o incluso al masticar después del tratamiento es normal. Dé tiempo a que la sensibilidad disminuya en unos días. Si los problemas persisten después de 30 días, por favor, póngase en contacto con nuestra oficina para programar una evaluación de seguimiento con su médico.
- Si siente que su mordida está desigual una vez que se le pase la anestesia, llame a nuestra oficina para programar una cita para posiblemente ajustar su oclusión (mordida). Esta mordida desigual ejerce demasiada presión sobre un diente específico, lo que puede causar dolor y, eventualmente, romper la nueva obturación.
- La sensación de molestia alrededor de las encías o la mandíbula es común debido a la posible proximidad de la caries al tejido de las encías, la instrumentación que se puede haber utilizado para el material o la administración de la anestesia (especialmente en la mandíbula inferior). La molestia debería desaparecer en unos días. Se puede usar Tylenol o Motrin para aliviar la molestia.
- Si tiene alguna otra pregunta o inquietud sobre sus nuevas obturaciones compuestas "blancas", no dude en ponerse en contacto con nosotros al (937) 644-1311.